

◀ Retinopatía Diabética - Información para el Oftalmólogo

Clasificación (adaptada del ETDRS)

A. Retinopatía Diabética No Proliferante

1 Mínima:	Sólo microaneurismas
2 Leve:	Microaneurismas, exudados duros, manchas algodinosas, hemorragias/microaneurismas escasos. (Fig 8)
3 Moderada:	Lo anterior, con mayor cantidad de hemorragias/microaneurismas (moderados). IRMA mínimo o rosarios venosos en sólo un cuadrante. (fig.9)
4 Severa:	Hemorragias ó microaneurismas severos en los 4 cuadrantes, rosarios venosos en 2 o más cuadrantes, IRMA severo en por lo menos 1 cuadrante. (Fig.10)
5 Muy Severa:	2 ó más signos de retinopatía severa. (fig.11)

B. Retinopatía Diabética Proliferante

6 Moderada:	Neovascularización retiniana y/o neovascularización papilar de menos de 1/3 de área papilar.
7 De alto riesgo:	Neovascularización papilar mayor a 1/3 de área papilar (fig.12) y/o hemorragia preretinal o vítrea, con neovascularización retinal ó papilar (fig. 13, fig. 14)
8 Avanzada:	Proliferación fibrovascular, desprendimiento de retina, hemorragia vítrea que oculta el fondo. (fig. 15)

C. Edema Macular Diabético

- No clínicamente significativo.
- Clínicamente significativo (EMCS) (Fig. 16)
 - a) Engrosamiento retiniano ó lípidos a menos de 500 micras del centro de la fovea.
 - b) Engrosamiento retiniano de un diámetro papilar ó mayor, parte del cual está a menos de un diámetro papilar del centro de la fovea.

TABLA 1

RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERANTE, SEVERA Y MUY SEVERA Regla del 4-2-1	
SEVERA	
▪ Microneurismas/Hemorragias severas en:	4 cuadrantes
▪ Rosarios venosos en al menos:	2 cuadrantes
▪ IRMA en al menos:	1 cuadrante
MUY SEVERA	
▪	2 ó 3 de los anteriores