

RESUMEN

Fueron hospitalizados 6756 pacientes en el I.B.G.J. durante los años 1990 a 1994, por alguna patología, de los cuales 265, osea el 3.9% fueron hospitalizados con diagnóstico de cáncer digestivo (esófago, estómago, intestino delgado, colon, hígado, vesícula, vías biliares y pancreas). Se procedió a la revisión de las 265 historias clinicas (3.9%), de pacientes internados con dicho diagnóstico, de los cuales solamente 202 historias clinicas fueron seleccionadas para tal estudio: excluyéndose a 63 pacientes por no llenar los requisitos del protocolo de investigación.

Los resultados obtenidos mostraron que la enfermedad es mas frecuente en el sexo femenino con el 54.8%. El grupo etáreo más afectado se encuentra entre los 55 y 64 años con el 29.70%, con un promedio de edad de 57 años, extremos entre 22 y 90 años. La localización mas frecuente estuvo en el estomago con el 29.70%. El años de mayor presentación resultó ser en 1994 con el 29.76%. La sintomatología más comun, el dolor abdominal, con el 97%. El diagnóstico estuvo dado por el método endoscópico en el 69% de los pacientes; seguido por el método quirúrgico en el 28%. El 96% de los cánceres digestivos se encontraban en estadio avanzado, y finalmente no se realizó tratamiento alguno en el 49% de los pacientes, por lo avanzado por la enfermedad o rechazo del paciente.