
ECZEMAS

Docente : Dr. Jordan
Materia : Dermatologia
Alumno : Fabiola O. Gamez Alessandri
Curso : 5to. Año
Fecha : Octubre 2002

Cochabamba - Bolivia

La Dermatitis Seborreica

Dermatitis seborreica

La dermatitis seborreica es la inflamación de las capas superficiales de la piel; provoca enrojecimiento, descamación y picazón. Es una condición hereditaria y suele verse agravada cuando hace frío.

La dermatitis seborreica es más común durante:

- **La infancia temprana**
En los bebés, la afección también se denomina "gorra de cuna", debido a que provoca la descamación del cuero cabelludo. No obstante, también puede afectar la zona que está en contacto con pañales. Normalmente, desaparece por sí sola durante el primer año de vida.
- **La edad madura**
Cuando la afección se presenta en esta etapa, suele ser más intermitente.
- **La vejez**
Cuando la afección se presenta en esta etapa, suele ser más intermitente.

Las personas que tienen piel o cabello grasos se encuentran en mayor riesgo de padecer dermatitis seborreica.

Síntomas de la dermatitis seborreica

A continuación, se enumeran algunos de los síntomas asociados con la dermatitis seborreica. Sin embargo, cada individuo puede experimentarlos de una forma diferente. Los síntomas pueden incluir los siguientes:

- Picazón del cuero cabelludo.
- Escamas secas o grasas en el cuero cabelludo.
- Erupción amarillenta o rojiza siguiendo la línea de crecimiento del cabello, detrás de las orejas, en el conducto auditivo, en las cejas, alrededor de la nariz y, o en el pecho.


Los síntomas de la dermatitis seborreica pueden parecerse a los de otras condiciones de la piel. Consulte siempre a su médico para el diagnóstico.

Diagnóstico la dermatitis seborreica


El diagnóstico de dermatitis seborreica sobre la base de la historia clínica y el examen físico.

Tratamiento de la dermatitis seborreica:

El tratamiento específico para la dermatitis seborreica será determinado por su médico basándose en lo siguiente:



D.seborreica medioesternal tipo petaloide



- Su edad, su estado general de salud y su historia médica.
- Qué tan avanzada está la condición.
- Su tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias.

Si bien esta condición responde al tratamiento, puede repetirse. El tratamiento suele aliviar los síntomas con eficacia y puede incluir:

- Pomada o loción con corticosteroides.
- Champú medicinal, en el caso de los adultos, según lo indique el médico.