


23



MED  
tesis...  
A339F  
2007

23- ✓



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON  
DEPARTAMENTO DE POST GRADO  
CAJA NACIONAL DE SALUD  
RESIDENCIA DE GINECO-OBSTETRICIA


FACTORES ECOGRAFICOS DE PRONOSTICO ADVERSO EN

# FACTORES DE MAL PRONÓSTICO EN PACIENTES CON AMENAZA DE ABORTO

AUTOR DR. BERONICA ALBORTA ESTEBAN.  
RESIDENTE DE SEGUNDO AÑO.


TUTOR: DR. ALFREDO VILLARROEL GOYTIA.  
DR. FREDDY MAYTA

GESTION: 2007.



ERWIN BUCHSTÄTTER  
GINECOLOGIA-OBSTETRICIA  
MT, PROF. H-004

Autor: Dra. Beronica Alborta  
Tutor: Dr. Alfredo Villarroel  
Dr. Freddy Mayta



37A

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON  
ESCUELA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA  
CAJA NACIONAL DE SALUD  
RESIDENCIA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA

PAGINAS

1. Resumen.....	3
2. Justificación.....	4

# FACTORES ECOGRAFICOS DE PRONOSTICO ADVERSO EN MUJERES CON DIAGNOSTICO DE AMENAZA DE ABORTO

7. Hipótesis.....	15
8. Variables independientes.....	16

9. Variab.....	16
10. Tipo y.....	16

11. Univer.....	17
12. Criter.....	17

13. Criter.....	17
14. Materi.....	17

15. Análisis.....	17
16. Tabla.....	17

17. Result.....	17
18. Conclus.....	17

19. Recomend.....	17
20. Bibliografía.....	17

21. Anexos.....	17
-----------------	----



*[Handwritten signature]*  
 DR. MED. ERWIN HOCHSTÄTTER  
 GINECOLOGIA - OBSTETRICIA  
 \* MAT. PROF. H - 80 \*

**Autor:** Dra. Beronica Alborta  
**Tutores:** Dr. Alfredo Villarroel  
 Dr. Freddy Mayta

*[Handwritten signature]*  
 GINECOLOGO - OBSTETRIA  
 MAT. V. 329



**GESTION 2008**  
**Cochabamba - Bolivia**



**INDICE** FACTORES ECOGRÁFICOS DE PRONÓSTICO ADVERSO EN  
MUJERES CON DIAGNÓSTICO DE AMENAZA DE ABORTO **PAGINAS**

1. Resumen.....	3
2. Justificación .....	4
3. Objetivo general.....	5
4. Objetivos específicos.....	5
5. Marco Teórico.....	6
6. Marco metodológico.....	16
7. Hipótesis.....	16
8. Variables independientes.....	16
9. Variables dependientes.....	16
10. Tipo y área de estudio.....	16
11. Universo y muestra.....	17
12. Criterios de inclusión.....	17
13. Criterios de exclusión.....	17
14. Material y métodos.....	17
15. Análisis estadísticos .....	18
16. Tabla estadística.....	19
17. Resultados.....	33
18. Conclusiones.....	34
19. Recomendaciones.....	35
20. Bibliografía.....	36
21. Anexo.....	37



## FACTORES ECOGRAFICOS DE PRONOSTICO ADVERSO EN MUJERES CON DIAGNOSTICO DE AMENAZA DE ABORTO

### JUSTIFICACION:

### INTRODUCCION:

La amenaza de aborto es un hecho relativamente frecuente, ya que afecta a un 25 % de los embarazos. El 50 % de ellos acabarán en aborto.

El 80 % de los abortos tiene lugar en el primer trimestre, y el resto hasta la semana 20<sup>a</sup>. La hemorragia del primer trimestre es también una causa frecuente de consulta y constituye a la vez una situación angustiosa para la gestante y su familia. La hemorragia del primer trimestre es sólo un signo clínico que puede corresponderse con diversos cuadros (gestación evolutiva con hemorragia Coria, gestación interrumpida, aborto incompleto o completo, enfermedad trofoblástica gestacional, embarazo ectópico, etc.)

Por lo tanto se pretende conseguir mediante este trabajo, detectar precozmente aquellos signos ecográficos de mal pronóstico, que culminan en la mayoría de los casos en un aborto.



OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Determinar signos ecográficos de mal pronóstico en pacientes embarazadas con ecografías hasta las 20 semanas de gestación.

**JUSTIFICACION:**

OBJETIVO ESPECIFICOS:

- Determinar la incidencia de pacientes hospitalizadas con diagnóstico de amenaza de Aborto.

- Identificar la sintomatología predominante en

Mediante este trabajo se pretende estimar la eficacia en nuestro servicio del estudio ecográfico para predecir un pronóstico de amenaza de aborto en todas las embarazadas con ecografía hasta las 20 semanas de gestación en el Hospital Obrero #2 de la Caja Nacional de Salud .

- Conocer la edad gestacional mas frecuente con ecografías sugestivas de mal pronóstico en pacientes embarazadas hasta las 20 semanas de gestación

- Identificar las características y evolución de los hematomas retrocervicales y retroplacentarios en pacientes con signos de mal pronóstico ecográfico hasta las 20 semanas de gestación

- Determinar el grupo etareo y la paridad como factores predisponentes de amenaza de aborto inherentes a la madre.