

HOSPITAL
ALBINA R. DE PATIÑO

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

**ETIOLOGÍA DE LA CONJUNTIVITIS
AGUDA PURULENTO EN PACIENTES
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL
“ALBINA PATIÑO”**

AUTORA : DRA. TATIANA QUEZADA SANDOVAL
RESIDENTE III
TUTOR : DR. CARLOS TERÁN E.
MÉDICO PEDIATRA - INFECTÓLOGO

COCHABAMBA - BOLIVIA

AÑO 2000

Introducción.....	2 pag.
Objetivos.....	3 pag.
Método.....	3 pag.
Descripción.....	4 pag.
Resultados.....	5 pag.
Conclusiones y sugerencias.....	6 pag.
Gráficos.....	9 pag.
Resumén.....	17 pag.
Referencia bibliografica.....	20 pag.

I.- Introducción.- La conjuntivitis aguda purulenta es una de las causas más comunes de consulta médica, sobre todo pediátrica. Es la inflamación ocular más común, se presenta a cualquier edad y en todo el mundo. Las principales causas de conjuntivitis aguda, son las alérgicas y las infecciosas, tanto virales como bacterianas. La causa más común de conjuntivitis aguda purulenta en la edad pediátrica es la infecciosa viral (1)(2)(3)(6). En la etapa neonatal se denomina oftalmía neonatal (4). Un 1,6% a 12% de los neonatos padecen conjuntivitis. La literatura extranjera concuerda en que los principales gérmenes causales de origen bacteriano son : *Stafilococo aureus*, *Haemophilus influenza* y *Streptococo neumoniae*, (1)(2)(4)(6)(7), en todas las edades, además de aislarse otros gérmenes como ser la *Moraxella catarrhalis* (5), etc.

En pacientes neonatales es de suma importancia el diagnóstico y tratamiento oportuno de la conjuntivitis neonatal debido a la alta incidencia de conjuntivitis no virales y de mayor agresividad como ser aquellas causadas por: *Neisseria gonorrhoeae* y la *Chlamydia trachomatis* (8)(9), que al no ser diagnosticados y tratados oportunamente pueden

ocasionar lesiones oculares severas e irreversibles, incluso pueden llevar a la pérdida de la visión.

La conjuntivitis aguda bacteriana es menos frecuente pero es la mas importante, por la severidad que pueden presentar y la necesidad de medicación correcta, ya que si bien la viral es la más comun, tiende a ser benigna y autolimitada . La conjuntivitis purulenta poco estudiada en nuestro medio, es causa común de automedicación y tratamientos inadecuados. En nuestro centro se reslizó 10 años atrás un estudio sobre conjuntivitis bacteriana, a pesar de contar con un universo de solo 36 pacientes, solo se encontro en dos de los pacientes los germenes más indicados por la literatura como causales de estas patologías, decidimos repetir este estudio con el fin de ampliar el mismo y confirmar los hallazos antes en pacientes atendidos en el Hospital Albina Patiño.

II.- Objetivo.-

Determinar los principales gérmenes causales de conjuntivitis aguda en pacientes atendidos en HAP.

IIa.-Objetivos secundarios.-

Determinar la incidencia de casos de conjuntivitis gonocócica en recién nacidos atendidos en HAP.

III.-Método.-

Estudio descriptivo longitudinal , no comparativo, realizado en HAP.

Criterios de inclusión :

Todo paciente con diagnóstico de conjuntivitis aguda no tratada.

Todo paciente con conjuntivitis bacteriana atendido tanto en policlínico o consulta externa como en salas de internación , comprendiendo una edad de 0 días a 18 años, sin tener en cuenta edad, sexo, procedencia, patologías asociadas.

Criterios de exclusión.-

Todo paciente con diagnóstico de conjuntivitis bacteriana que hubiese recibido tratamiento tópico o sistémico con antibióticos 48 a 7 horas