

COXA VARA

TECNICA QUIRURGICA SIMPLIFICADA DE CORRECCION EN ADULTOS Y ADOLESCENTES

I N D I C E

I.- INTRODUCCION

II.- OBJETIVOS

III.- MATERIAL Y METODOS

IV.- MECANISMO DE PRODUCCION

- Causas
- Etiología
- Anatomía patológica
- Cuadro clínico

**V.-TRATAMIENTO Y TECNICAS QUIRURGICAS
EMPLEADAS**

VI.- TECNICA QUIRURGI OMENDADA

- Resultados
- Comentarios
- Conclusiones

VII.- BIBLIOGRAFIA

**TRABAJO DE INGRESO A LA SOCIEDAD DE ORTOPEDIA
Y
TRAUMATOLOGIA**

Dr. CARLOS MILAN B.

Cochabamba-Bolivia

1989

TECNICA QUIRURGICA SIMPLIFICADA DE CORRECCION

EN ADULTOS Y ADOLESCENTES

(Relato de dos Casos)

I. INTRODUCCION

El término COXA VARA significa una disminución de ángulo entre el cuello y la diafisis del fémur, designado ANGULO CERVICO DIAFISARIO O DE INCLINACION, cuyo valor normal varia de 125 a 135 grados.

En 1881 Fiorani publicó la primera descripción clínica de una lesión de cadera por incurvamiento del cuello del fémur, después de haber observado a 15 pacientes en su mayoría niños, que presentaban leve cojera iniciada poco después de la deambulación. En 1889 Muller publicó observaciones similares de este particular arqueamiento del fémur y en 1894 Hofmeister sugirió que se diese a este estado el nombre de COXA VARA.

Kredel en 1896, fue el primero que describió una coxa vara congénita obvia que había notado en dos niños, que también tenían pie equino varo congénito. En su acepción original, el término coxa vara denotaba una particular deformidad de la diafisis femoral en aducción, en relación con la cabeza y el cuello del hueso.

En el presente trabajo, se realiza la revisión de dos casos de coxa vara y se describe un procedimiento quirúrgico simple.